

Lymfom undertyper

Non- Hodgkin lymfomer består af næsten 30 undertyper efter WHO's klassifikationssystem. Hovedinddelingen er efter om lymfomerne udgår fra B- eller T-lymfocytter. De hyppigste er follikulært lymfom (20 pct.) og diffust storcellet B-celle lymfom (40 pct.)

B-celle lymfomer:

- Prækursor B lymfoblast lymfom
- Småcellet lymfocytært lymfom
- Lymfoplasmacytært lymfom
- Splenisk marginal zone lymfom
- Ekstranodalt marginal zone B-celle lymfom (MALT-lymfom)
- Nodalt marginal zone B-celle lymfom
- Follikulært lymfom
- Mantle celle lymfom
- Diffust storcellet B-celle lymfom
- Mediastinalt storcellet B-celle lymfom
- Intravaskulært storcellet B-celle lymfom
- Primært effusions lymfom
- Burkitt lymfom
- Post-transplantation lymfoproliferativ sygdom (PTLD)

T-celle lymfomer:

- Prækursor T-lymfoblast lymfom
- Blast NK celle lymfom
- T-celle lymfom (adult)
- Extranodalt NK/T-celle lymfom, nasal type
- T-celle lymfom af enteropati-type
- Hepatosplenisk T-celle lymfom
- Subkutant panniculitis-lign. T-celle lymfom
- Mycosis fungoides
- Sezary's syndrome
- Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom
- Perifert T-celle lymfom, uspecificeret
- Angioimmunoblastisk T-celle lymfom
- Anaplastisk storcellet lymfom
- Lymfomatoid papulose